



## Gingivectomy and gingivoplasty

A gengivectomia é um procedimento cirurgico que visa a excisão da parede mole da bolsa periodontal que pode provocar o aumento da coroa clínica aparente dos dentes, em função de o espaço ocupado pela presença da bolsa periodontal ser antes da doença, ocupado pelos tecidos: gengiva marginal, sulco gengival, ligamento gengival, osso alveolar e ligamento periodontal. A gengivoplastia é uma cirurgia que visa devolver o contorno anatômico normal da gengiva em áreas onde o tecido gengival esta alterado, sem a ocorrência de destruição dos tecidos periodontais provocados pela periodontite. A gengivectomia é indicada em bolsas periodontais supra ósseas que não ultrapassem a união muco gengiva, não permite acesso ao tecido ósseo, entretanto, quando bem indicada pode ser eficiente. O pós operatório pode ser dolorido devido a área cirurgica cicatrizar por segunda intenção. Portanto a administração de analgésicos e anti-inflamatórios podem ser necessários. Raramente o periodo de pós operatório causam problemas, entretanto, hemorragias podem acontecer e devem ser inibidas com compressão da ferida cirúrgica.


Periodontal plastic and mucogingival surgery. Prato, G.P., Clauser, C., Cortellini, P. Peiodontol 2000. 1995; 9:90-105.



Clínico radiográfico inicial.



Sondagem e demarcação das profundidades das bolsas.



Incisões com bisturi de Kirkland e de Orban.



Procedimentos cirúrgicos por vestibular.



Pós operatório de 7 dias e de 1 ano.

